

Platicarpa Flat peach Pêche plate

Legenda
Legend
Légende

N Nettarine
Nectarine
Nectarine

Polpa / Flesh / Pulpe


■ Platicarpa a polpa gialla
Yellow flesh flat peach
Pêche plate à chair jaune

■ Platicarpa a polpa bianca
White flesh flat peach
Pêche plate à chair blanche

Moltiplicata su concessione
Multiplication concession of
Multipliée sur concession

Ⓟ Provedo

Ⓟ Psb



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto influenzata dall'andamento climatico. Zona di riferimento MURCIA (Spagna).
Si intende come "varietà a basso fabbisogno di freddo" nel range di 50-100 e le 450-500 ore freddo.

The ripening period is indicative as it is influenced by the climate. MURCIA (Spain) reference area.
It is a "low chilling variety" with a range of 50-100 to 450-500 chilling hours.

La période de maturation est indicative car influencée par les tendances climatiques. Zone de référence MURCIA (Espagne).
Une variété entre 50-100 et 450-500 heures de froid est considérée comme une variété à «faibles besoins en froid».


Percoca Cling Peach Pavie

Legenda
Legend
Légende

Moltiplicata su concessione
Multiplication concession of
Multipliée sur concession

Ⓟ Provedo

Ⓟ Psb



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto influenzata dall'andamento climatico. Zona di riferimento MURCIA (Spagna).
Si intende come "varietà a basso fabbisogno di freddo" nel range di 50-100 e le 450-500 ore freddo.

The ripening period is indicative as it is influenced by the climate. MURCIA (Spain) reference area.
It is a "low chilling variety" with a range of 50-100 to 450-500 chilling hours.

La période de maturation est indicative car influencée par les tendances climatiques. Zone de référence MURCIA (Espagne).
Une variété entre 50-100 et 450-500 heures de froid est considérée comme une variété à «faibles besoins en froid».

Vivai Pianta Battistini
Società Agricola s.s.

via Ravennate, 1500
47522 Cesena (FC) Italia

tel. +39 0547 380545
fax +39 0547 384400


batvivai@battistinivivai.com
www.battistinivivai.com



Varietà a basso
fabbisogno di freddo

Low chilling variety

Variété à faibles
besoins en froid




Ciliegio Cherry Cerise

Legenda
Legend
Légende

A Autofertili
Self-fertile
Autofertile

Moltiplicata su concessione
Multiplication concession of
Multipliée sur concession

CO Cot International
I Ips
Vb Vivai Piante Battistini s.s.



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto influenzata dall'andamento climatico. Zona di riferimento Emilia Romagna (Italia).
Si intende come "varietà a basso fabbisogno di freddo" nel range di 300-450 ore freddo.

The ripening period is indicative as it is influenced by the climate. Emilia Romagna (Italia) reference area.
It is a "low chilling variety" with a range of 300 to 450 chilling hours.

La période de maturation est indicative car influencée par les tendances climatiques. Zone de référence Emilia Romagna (Italia).
Une variété entre 300 et 450 heures de froid est considérée comme une variété à «faibles besoins en froid».

Albicocco Apricot Abricot


Legenda
Legend
Légende

A Autofertili
Self-fertile
Autofertile

Moltiplicata su concessione
Multiplication concession of
Multipliée sur concession

CO Cot International
b Bee
Psb

Albicocca rossa
Red apricot
Abricot rouge



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto influenzata dall'andamento climatico. Zona di riferimento MURCIA (Spagna).
Si intende come "varietà a basso fabbisogno di freddo" nel range di 200-300 e le 450-500 ore freddo.

The ripening period is indicative as it is influenced by the climate. MURCIA (Spagna) reference area.
It is a "low chilling variety" with a range of 200-300 to 450-500 chilling hours.

La période de maturation est indicative car influencée par les tendances climatiques. Zone de référence MURCIA (Spagna).
Une variété entre 200-300 et 450-500 heures de froid est considérée comme une variété à «faibles besoins en froid».

Pesco Peach Pêche


Legenda
Legend
Légende

Polpa / Flesh / Pulpe
■ Pesca a polpa gialla
Yellow flesh peach
Pêche à chair jaune

■ Pesca a polpa bianca
White flesh peach
Pêche à chair blanche

Moltiplicata su concessione
Multiplication concession of
Multipliée sur concession

P Provedo
I Ips
Psb



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto influenzata dall'andamento climatico. Zona di riferimento MURCIA (Spagna).
Si intende come "varietà a basso fabbisogno di freddo" nel range di 50-100 e le 450-500 ore freddo.

The ripening period is indicative as it is influenced by the climate. MURCIA (Spagna) reference area.
It is a "low chilling variety" with a range of 50-100 to 450-500 chilling hours.

La période de maturation est indicative car influencée par les tendances climatiques. Zone de référence MURCIA (Spagna).
Une variété entre 50-100 et 450-500 heures de froid est considérée comme une variété à «faibles besoins en froid».



Nettarina Nectarine Pêche nectarine


Legenda
Legend
Légende

Polpa / Flesh / Pulpe
■ Nectarina a polpa gialla
Yellow flesh nectarine
Nectarine à chair jaune

■ Nectarina a polpa bianca
White flesh nectarine
Nectarine à chair blanche

Moltiplicata su concessione
Multiplication concession of
Multipliée sur concession

P Provedo
Psb
M Mondial Fruit Selection



L'epoca di maturazione è indicativa in quanto influenzata dall'andamento climatico. Zona di riferimento MURCIA (Spagna).
Si intende come "varietà a basso fabbisogno di freddo" nel range di 50-100 e le 450-500 ore freddo.

The ripening period is indicative as it is influenced by the climate. MURCIA (Spagna) reference area.
It is a "low chilling variety" with a range of 50-100 to 450-500 chilling hours.

La période de maturation est indicative car influencée par les tendances climatiques. Zone de référence MURCIA (Spagna).
Une variété entre 50-100 et 450-500 heures de froid est considérée comme une variété à «faibles besoins en froid».